

Алирин-Б, Ж

Норма расхода препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
5 л/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000-1500 л/га	-(4)	-(-)
5 л/га	Городские зеленые насаждения, декоративные насаждения, лесозащитные полосы*	Корневые и прикорневые гнили, фузариоз	Полив лунок, полив под корень. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(1-3)	-(-)
		Альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(2-3)	-(-)
5 л/га	Хвойные и декоративно лиственные растения в питомниках*	Корневые и прикорневые гнили, фузариоз	Полив лунок, полив под корень. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(1-3)	-(-)
		Альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(2-3)	-(-)

*находятся на стадии расширения регистрации