

Гамаир, КС

Норма расхода препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
5 л/га	Городские зеленые насаждения, декоративные насаждения, лесозащитные полосы*	Корневые и прикорневые гнили, фузариоз	Полив лунок, полив под корень. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(1-3)	-(-)
		Альтернариоз, бактериоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(2-3)	-(-)
5 л/га	Питомники хвойных и декоративно лиственных*	Корневые и прикорневые гнили, фузариоз	Полив лунок, полив под корень. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(1-3)	-(-)
		Альтернариоз, бактериоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(2-3)	-(-)
5 л/га	Цветочно-декоративные растения открытого грунта*	Черная ножка, корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив грунта раствором препарата перед высадкой рассады и в течении вегетации. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(3)	-(-)
		Мучнистая роса, септориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(3)	-(-)

* находятся на стадии расширения регистрации