

Микозар, СП, упаковка 200 г

Норма расхода препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
200-300 г/га	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, бактериальный рак	Полив субстрата под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га	-(5)	-(-)
200-300 г/га		Фитофтороз, белая и серая гнили	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	-(5)	1(1)
200-300 г/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив субстрата под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га	-(5)	-(-)
200-300 г/га		Мучнистая роса, белая и серая гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	-(5)	1(1)