

## Гамаир, СП, упаковка 60 г

| Норма расхода препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект   | Способ, время, особенности применения препарата  | Сроки ожидания, кратность обработок | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 1-2 г/кг                | Томат защищенного грунта        | Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили   | Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости 1 л/кг                                 | -(1)                                | -(-)   |
| 60-120 г/га             |                                 |  | Опрыскивание растений в период вегетации: при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га | -(3)                                | 1(1)   |
| 60 г/га                 | Огурец защищенного грунта       | Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, белая и серая гнили, мучнистая роса | Полив грунта через 14-15 дней после высадки рассады, затем с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га   | -(3)                                | -(-)   |
| 60-150 г/га             |                                 |  | Опрыскивание растений в период вегетации: при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га    | -(2)                                | 1(1)   |