

Регламент применения препарата Алирин-Б, СП, модифицированный, упаковка 120 г

Норма применения препарата, г/га, г/т	Культура (группа культур)	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода на обработанные участки (руч/мех)
2 г/кг	Томат защищённого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, фитофтороз	Замачивание семян с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости 1 л/кг	-(1)	-(-)
120 - 240 г/га			Полив грунта под корень при появлении первых симптомов болезни, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га	-(3)	-(-)
120 - 240 г/га			Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов болезни, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га	-(2)	1(1)
120 г/га	Огурец защищённого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив грунта через 14-15 дней после высадки рассады, затем с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га	-(3)	-(-)
120-300 г/га		Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га	-(2)	1(1)