

Регламент применения препарата Гамаир, СП, упаковка 60 г

Норма применения препарата, г/га, г/т	Культура (группа культур)	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода на обработанные участки (руч/мех)
1-2 г/кг	Томат защищённого грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости 1 л/кг	-(1)	-(-)
60-120 г/га			Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га	-(3)	1(1)
60 г/га	Огурец защищённого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, белая и серая гнили, мучнистая роса	Полив грунта через 14-15 дней после высадки рассады, затем - с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га	-(3)	-(-)
60-150 г/га			Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 500-3000 л/га	-(2)	1(1)