

## Регламент применения препарата Микозар, СП, упаковка 200 г

Норма применения препарата,	Культура (группа культур)	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода на обработанные участки (руч/мех)
200-300 г/га	Томат защищённого грунта	Трахеомикозное увядание	Полив субстрата под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га	- (5)	- (-)
200-300 г/га		Фитофтороз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	- (5)	1 (1)
200-300 г/га	Огурец защищённого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив субстрата под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га	- (5)	- (-)
200-300 г/га		Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	- (5)	1 (1)
200-300 г/га	Роза защищённого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Капельный полив под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем — с интервалом 20–30 дней. Расход рабочей жидкости 2000 л/га.	- (6)	- (-)
200-300 г/га		Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10–20 дней. Расход рабочей жидкости 1000–1500 л/га.	- (6)	1 (1)